

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-  
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

(CÔTE-D'OR, DOUBS, HAUTE-SAÔNE, JURA, SAÔNE-ET-LOIRE, TERRITOIRE DE BELFORT)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.  
C. C. P. : DIJON 5.405-19

ABONNEMENT ANNUEL

15 NF

Bulletin N° 46 de Juillet 1964

7 Juillet 1964

## V I G N E

MILDIOU - Poursuivre l'élimination des jeunes pousses par des rognages successifs. Un traitement dirigé contre cette maladie sera à effectuer dans les cinq jours qui suivront la prochaine pluie importante.

Apporter le plus grand soin à l'exécution de cette application qui pourrait être la dernière de cette campagne.

OIDIUM - Surveiller attentivement la vigne - intervenir en cas d'apparition de cette maladie

COCHYLIS-EUEMIS - Le deuxième vol est particulièrement important surtout en Saône et Loire (ROMANECHE-THORINS) intervenir dès réception de l'avis.

NOCTUELLES - Des attaques de chenille de noctuelles sur pousses et sur raisins sont constatées dans certains climats de la côte de GEVREY-CHAMBERTIN à CHASSAGNE-MONTRACHET l'importance de ces attaques est très variable. Il appartient au Viticulteur de décider de l'opportunité d'une intervention suivant le degré de gravité de l'attaque, cette dernière pouvant s'accroître si la sécheresse actuelle se poursuivait. Les produits à base de DIELDRINE paraissent les plus efficaces - dose de 1 litre à l'hectare soit 5 litres d'une spécialité commerciale à 20 % - Surveiller particulièrement les jeunes plantes et les pépinières.

## ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES.- Le vol bien que faible se poursuit - Continuer la protection.

TAVELURES - L'adjonction d'un fongicide à la bouillie précédente ne se justifie que dans les vergers où la maladie est présente.

## CULTURES LEGUMIÈRES

PUCERONS - De fortes attaques de pucerons cendrés et de pucerons verts sont constatés sur choux - Traiter avec l'un des produits suivants :

MALATHION	Délai d'emploi	7 Jours avant récolte
PARATHION	::	15 Jours avant récolte
MEVINPHOS (Phosdrin)	::	7 Jours avant récolte

P62

## B E T T E R A V E S

Du fait de la sécheresse prolongée les dégâts des différents parasites de la betterave risquent de compromettre la production.

PEGOMYIES ( Mouche de la betterave ) - De nombreuses pontes sont observées dans certains secteurs - Surveiller l'apparition des larves et intervenir à temps.

VERS GRIS ( Noctuelles ) - L' utilisation de la Dieldrine à raison de 1 kg de matière active à l'hectare permet de lutter contre ces chenilles et également contre la Pegomyie.

TEIGNE - Les papillons de 2ème génération ont fait leur apparition . Appliquer un traitement insecticide dès que la présence de chenilles sera constatée.

PUCERONS - Ne pas attendre l'extension des colonies pour intervenir.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés  
des Avertissements Agricoles

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux  
H. SOULIE.

Imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté  
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX